



АФТЫ

Авторы: Н. Н. Бажанов; В. А. Есепёнок

АФТЫ (новолат. *aphthae*, от греч. *ἀφθαί* – высыпания, изъязвления в полости рта), небольшие эрозии слизистой оболочки полости рта круглой или овальной формы, дно которых покрыто желтоватым налётом, окружено венчиком яркой гиперемии. А. – осн. признак т. н. афтозного стоматита. Располагаются на боковых поверхностях языка, на внутр. поверхности щёк, губах, реже на слизистой оболочке твёрдого и мягкого нёба, могут быть единичными и сливаться в большие язвы. Образование А. сопровождается болезненностью, затруднением жевания и речи, обильным слюноотделением, повышением темп-ры и увеличением лимфатич. узлов. А. наблюдаются при простудных и т. н. системных (желудочно-кишечных и др.) заболеваниях, сифилисе, ящуре и др. Развитие А. продолжается 5–7 дней, после заживления следов от них не остаётся. Их появлению могут способствовать психич. напряжение и повышенная физич. нагрузка.

А. у животных – специфич. поверхностные поражения слизистых оболочек и кожи. Появляются обычно в ротовой полости и межкопытной щели у крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и др. животных, гл. обр. при ящуре, в виде пузырей величиной от горошины до ореха, наполненных прозрачной жидкостью. Они могут сливаться между собой и иметь разл. форму (полушаровидную, овальную или круглую). На месте лопнувших А. образуются болезненные ранки с неровными краями. Поражённые участки обрабатывают дезинфицирующими и вяжущими средствами. Если в ранки не попала патогенная микрофлора, то они заживают без образования рубца.