



АХАЛАЗИ́Я ПИЩЕВО́ДА

Авторы: В. Д. Платонов, А. С. Трухманов

АХАЛАЗИ́Я ПИЩЕВО́ДА, ахалазия кардии (новолат. *achalasia*, от *a...* и греч. *χάλασις* – расслабленность), отсутствие рефлекса расслабления нижнего пищеводного сфинктера (кардиального сфинктера, кардии) в ответ на проглатывание пищи, сопровождающееся нарушением перистальтической функции грудного отдела пищевода. А. п. проявляется затруднением прохождения твёрдой и жидкой пищи по пищеводу в желудок (срыгивание пищей, кашель, боли в области передней поверхности грудной клетки, похудание). Заболевание прогрессирующее, может осложняться повторными аспирационными пневмониями, развитием эзофагита, лейкоплакии эпителия слизистой оболочки пищевода. Диагноз подтверждается рентгенологич. и эндоскопич. исследованиями. Осн. метод лечения – баллонная кардиодилатация, основанная на расширении нижнего пищеводного сфинктера воздухом или жидкостью, которые нагнетаются под давлением в баллон, установленный в области кардии. При невозможности проведения кардиодилатации прибегают к кардиотомии (рассечение мышечного слоя нижнего отдела пищевода).