



БАРТОЛИНИ́Т

Авторы: В. Л. Тютюнник

БАРТОЛИНИ́Т (от имени К. *Бартолина* младшего и *...ит*; новолат. *bartholinitis*), воспаление большой (бартолиновой) железы преддверия влагалища, вызываемое микроорганизмами, проникающими в выводной проток железы из инфицированных выделений влагалища или уретры. Чаще бывает односторонним. Воспалительный отёк может закупоривать проток железы, препятствуя выделению секрета, который растягивает его, образуя кисту (ложный абсцесс). Железа болезненна, увеличена в размерах. Иногда воспалительный процесс захватывает ткань железы, вызывая истинный абсцесс с гнойным расплавлением железы и окружающих тканей. После вскрытия абсцесса состояние женщины улучшается. Воспалительный процесс может пройти без нагноения. При переходе Б. в хронич. форму стенки выводного протока железы уплотняются, часто воспалительный процесс возобновляется и осложняется. Вначале заболевание может не причинять сильного беспокойства, но при ухудшении состояния появляется резкая боль, усиливающаяся при движении и половых сношениях, повышается темп-ра тела. В начальной стадии болезни назначают постельный режим, болеутоляющие и антибактериальные средства; при ухудшении состояния необходима госпитализация. Профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены, своевременном лечении вульвита, кольпита, уретрита.