

БУТЫЛКОНОСЫ

Авторы: Н. А. Щипанов




Рис. Е. Н. Федорченко
Высоколобый бутылконос.

БУТЫЛКОНОСЫ (*Hyperoodon*), род млекопитающих сем. клюворыловых отр. китообразных. Длина тела самцов до 9,4 м, самок до 8,7 м. Голова небольшая, клюв чётко выражен, что придаёт Б. сходство с дельфинами. Лобный выступ, образованный жировой подушкой, у самцов Б. развит сильнее,

чем у самок, и с возрастом увеличивается. Зубы только на нижней челюсти; обычно 1 пара вынесена далеко вперёд и напоминает бивни. Туловище длинное и узкое; спинной плавник небольшой, с вырезом по заднему краю, расположен ближе к хвосту. Спина чёрно-серая, брюхо светлее. В роде 2 вида. Высоколобый Б. (*H. ampullatus*) обитает в северной части Атлантического океана; встречается в Средиземном м., заходит в Белое, Баренцево и Балтийское моря. Плосколобый Б. (*H. planifrons*) распространён в Юж. полушарии от льдов Антарктиды до широты Буэнос-Айреса, Новой Зеландии и юго-зап. берегов Австралии. Б. держатся смешанными или однополыми группами по 10–20 особей. Совершают сезонные миграции, придерживаясь открытых вод. Охотятся, ныряя на большую глубину; долго остаются под водой (до 1 ч). Питаются главным образом головоногими моллюсками, частично рыбой. Продолжительность беременности не менее 12 мес. Длина новорождённых ок. 3 м; длительность молочного кормления 6–7 мес. Оба вида Б. внесены в Красную книгу МСОП, высоколобый Б. – в Красную книгу РФ.