



ВЛАСОГЛАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Авторы: А. В. Чесунов

ВЛАСОГЛАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (*Trichuris trichiura*, ранее *Trichocephalus trichiuris*), паразитическая нематода из рода трихоцефалы. Тело длиной ок. 5 см (самки крупнее), с тонкой волосовидной передней (отсюда назв.) и резко утолщённой, более короткой задней частями. Возбудитель [трихоцефалёза](#). Локализуется в толстом кишечнике (гл. обр. в слепой кишке) человека. Самка откладывает 3–4 тыс. яиц ежедневно. Процесс их созревания (формирования личинки) начинается после попадания во внешнюю среду. Около месяца они развиваются в почве и становятся инвазионными, сохраняя жизнеспособность до полутора лет. Из таких яиц, занесённых в кишечник человека с загрязнёнными продуктами питания и водой, в тонком кишечнике выходят личинки, которые внедряются в микроворсинки слизистой оболочки и остаются там ок. 10 сут. Полностью сформировавшиеся особи спускаются в толстую кишку и передним концом тела фиксируются на её стенке; через 1,5–2 мес паразиты способны к размножению. Распространён повсеместно, в осн. в районах с влажным и умеренно тёплым климатом. Паразитирование может продолжаться 5–6 лет.