

ВОДОРЕЗЫ

Авторы: В. М. Лоскот



Чёрный водорез.

ВОДОРЕЗЫ (*Rynchops*), род птиц отр. ржанкообразных. Длина 36–48 см, масса 110–360 г, самцы крупнее самок. Окраска оперения у взрослых птиц сверху чёрная или буровато-чёрная; лоб и нижняя часть тела белые. Клюв оранжевый или красный с жёлтой или чёрной вершиной, лапы красные. Шея утолщённая, с

хорошо развитой мускулатурой. Клюв длинный, высокий, сжатый с боков, нижняя челюсть на $\frac{1}{4}$ длиннее верхней. Крылья длинные, острые. Хвост короткий, с выемкой. Ноги короткие, перепончатые. 3 близкородств. вида. Обитают на побережьях морей, внутр. водоёмов, устьев крупных рек в тропиках и субтропиках. Чёрный В. (*R. niger*) распространён на юго-востоке Сев. Америки, в Центр. и Юж. Америке, африканский В. (*R. flavirostris*) – в Африке, индийский В. (*R. albicollis*) – в Юго-Вост. Азии. Питаются мелкой рыбой и креветками. Охотятся обычно на мелководье, нередко в сумерках или лунными ночами. Ловят добычу, летая низко над водой и разрезая её поверхность нижней частью клюва (отсюда назв.). Гнездятся колониями от десятков до нескольких тысяч пар на песчаных островах и косах. Гнездо – ямка в песке или среди ракушек. В кладке 3–4 (1–5) яйца, которые оба родителя насиживают ок. 3 нед. Птенцы покрыты густым рыжеватым пухом; с первого дня жизни хорошо бегают и плавают. Способность к полёту молодые особи приобретают в возрасте 5 недель.