

# ВОМБАТЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Короткошёрстный вомбат.

ВОМБАТЫ, вомбатовые (Vombatidae), семейство млекопитающих отр. двурезцовых сумчатых. Длина тела до 105 см, масса до 30 кг. Тело толстое, короткое, приземистое. Конечности сильные, пятипалые с большими когтями. Голова утолщённая, широкая. Хвост рудиментарный. Выводковая сумка открывается назад. В семействе 2 рода, которые внешне заметно различаются. В роде короткошёрстные *V.*

(*Vombatus*) – единственный одноим. вид (*V. ursinus*). Шерсть короткая и грубая, пуховые волосы практически отсутствуют. Окраска жёлто-серая. Род длинношёрстные *V.* (*Lasiorhinus*) включает 2 вида: квинслендский вомбат (*L. krefftii*) и длинношёрстный вомбат (*L. latifrons*). Шерсть относительно длинная, мягкая, с хорошо развитой подпушью. Окраска буро-серая; выше и ниже глаз – белые пятна. *V.* распространены в Юж. и Вост. Австралии, а также на о. Тасмания (короткошёрстные *V.*). Населяют участки редколесья и саванн. Активны ночью. Держатся обычно поодиночке. Роят длинные (до 30 м), сложно устроенные норы; при этом своими мощными резцами перегрызают крупные корни. Способны валить большие деревья. Перед входом в нору устраивают лёжку, где принимают солнечные ванны. Питаются травой, корой и корнями растений. От норы к местам кормёжки *V.* прокладывают хорошо утопанные тропы. В помёте 1 детёныш. Численность всех видов *V.* невысокая. Квинслендский вомбат внесён в Красную книгу МСОП.