



ДИКОБРАЗЫ АМЕРИКАНСКИЕ

Авторы: Н. А. Щипанов

ДИКОБРАЗЫ АМЕРИКАНСКИЕ (Erethizontidae), семейство млекопитающих отр. грызунов. Длина тела от 30 см (амазонские дикобразы) до 103 см (североамериканские дикобразы), масса 7–18 кг. Самцы крупнее самок. Все конечности четырёхпалые, приспособлены к лазанию по деревьям. 3–4 рода: амазонские дикобразы (*Echinoprocta*), цепкохвостые дикобразы (*Coendou*), южноамериканские дикобразы (*Sphiggurus*) и североамериканские дикобразы (*Erethizon*); 11–12 видов. Хвост короткий или почти равен длине тела, хватательный. На туловище и хвосте имеются короткие острые иглы с зазубринами на вершинах, на спине – длинные щетины. Окраска тёмная (коричнево-чёрная), волосы и иглы с белыми полосами. Населяют умеренные и тропич. области Сев. и Юж. Америки. Придерживаются лесных районов. Хорошо, но медленно лазают по деревьям. Активны гл. обр. ночью. Убежища находят в естеств. пустотах: пещерах, расселинах, дуплах и т. п. Питаются листьями, корой, проростками, цветками, плодами и корнями деревьев. В году 1 помёт (1–4 детёныша). Местами могут наносить заметный ущерб лесному хозяйству. Все виды Д. а. внесены в Красную книгу МСОП.