

ДУРМАН

Авторы: Б. Н. Головкин



Дурман обыкновенный.

ДУРМАН (*Datura*), род растений сем. паслёновых. Однолетние, обычно высокие травы. Листья очередные (длина 10–20 см), лопастные или крупнозубчатые, слегка опушённые, часто с неприятным запахом. Цветки направлены вверх, трубчатые с воронковидным отгибом до 12 см в диаметре, белые, жёлтые, розовые или пурпурно-фиолетовые, часто ароматные. Плод – шиповатая коробочка с многочисл. семенами. 7–8 видов, преим. в субтропиках Сев. Америки. Во флоре России 1 вид – Д. обыкновенный, или вонючий (*D. stramonium*), – однолетнее заносное сорное растение, распространённое в степной полосе Европ. части, в юж. районах Сибири и

Дальнего Востока. Растёт на мусорных местах, под заборами, близ жилья, по берегам водоёмов. Иногда образует чистые заросли. Все части растения (в осн. листья и семена) содержат ядовитые и галлюциногенные алкалоиды атропин и скополамин, используемые в медицине (гл. обр. спазмолитическое, успокаивающее действие). Как лекарственное растение Д. обыкновенный культивируется на небольших площадях; чаще выращивают Д. индийский (*D. innoxia*) или темноцветковый (*D. tatula*). Иногда к роду Д. относят и виды южноамериканского рода [бругмансия](#).