



# ЕРНИКИ

Авторы: Л. П. Рысин

---

ЕРНИКИ (ёрники), растительные сообщества низкорослых (выс. до 1–2 м) берёз: карликовой (*Betula nana*), тощей (*B. exilis*), круглолистной (*B. rotundifolia*), растопыренной (*B. divaricata*), кустарниковой (*B. fruticosa*). Занимают значит. площади на севере Европы и на Аляске. На территории России Е. тянутся полосой (шириной до 200–250 км) от Кольского п-ова до р. Лена, а также в горах Сибири (выше границы леса). В первом ярусе растительности берёзе нередко сопутствуют разл. виды ивы (филиколистная, сизая, лопарская, мохнатая и др.); во втором ярусе обычно доминируют кустарнички и полукустарнички (вороника, черника, голубика, брусника). В долинах ручьёв и на пологих склонах с постоянным проточным увлажнением увеличивается доля травянистых растений. В живом напочвенном покрове в зависимости от условий местообитания преобладают лишайники, зелёные или сфагновые мхи. На всём протяжении юж. части тундровой зоны крупными массивами и небольшими участками встречаются ерниковые тундры, часто в сочетании со сфагновыми болотами и ивняками. В процессе естеств. заболачивания такие тундры трансформируются в болота; при этом заросли берёзы редуют или вообще исчезают. Ерниковые тундры круглогодично служат пастбищем для северных оленей, местное население использует древесину как топливо. Ерниковый подлесок характерен для ряда лесотундровых экосистем. В лесную зону Е. проникают далеко на юг по заболоченным местообитаниям; они встречаются также в горах выше границы леса.