

ЖАБЫ

Авторы: Н. Н. Иорданский



Фото Ю. Б. Шибиева
Обыкновенная жаба.

ЖАБЫ (Bufonidae), семейство бесхвостых земноводных. Длина тела 2–25 см. Туловище широкое, массивное; конечности короткие; концы пальцев у большинства не имеют дисковидных расширений. Зубы отсутствуют. Кожа бугристая, окраска серо-буроватая, защитная. Семейство включает ок. 450 видов, из которых св. 200 принадлежат к роду собственно Ж. (*Bufo*). Распространены на всех материках, кроме Антарктиды; могут жить в засушливых районах. В России 4 вида:

обыкновенная, или серая, жаба (*B. bufo*), обитает в центре Европ. части, на Кавказе, на юге Сибири и Дальнего Востока; зелёная жаба (*B. viridis*) – в Европ. части до 60° с. ш., на Кавказе и юге Сибири; монгольская жаба (*B. raddei*) – на юге Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока; камышовая жаба (*B. calamita*) – в Калининградской обл. Большинство Ж. ведут сумеречный наземный образ жизни. Передвигаются медленно, прыгают и плавают плохо; нередко зарываются в почву. Зимуют на суше. Питаются разл. беспозвоночными (насекомыми, пауками, слизнями, дождевыми червями и др.); крупные виды (*agra*) могут поедать также мелких земноводных и др. позвоночных. Секрет крупных околоушных (паротоидных) желёз у Ж. ядовит, но у них нет приспособлений для его активного выведения наружу: яд выделяется в ответ на болевые раздражения. Мелкие ядовитые железы, имеющие открытые выводные протоки, рассеяны в коже спинной стороны тела. Их секрет оказывает раздражающее действие при попадании на слизистые оболочки ротовой полости и глаз. Большинство Ж. размножаются, откладывая в водоёмах икру

длинными жгутами, содержащими неск. тысяч яиц. Мелкие (длиной 20–30 мм)
африканские Ж. рода *Nectophrynooides* характеризуются яйцеживорождением, а один
из видов этого рода (*N. occidentalis*) – истинным живорождением.