



КААТИНГА

Авторы: С. А. Баландин

КААТИНГА (португ. *caatinga*; на яз. индейцев тупи саа – белый, светлый, *tinga* – лес, т. е. лес без тени), тропич. листопадные ксерофитно-суккулентные редколесья (опустыненные саванны) на северо-востоке Бразильского плоскогорья; развиваются на маломощных латеритных почвах (с высоким содержанием алюминия) или на каменистых выходах и измельчённых обломочных породах. Жаркий и сухой климат с длительным засушливым периодом (8–9 мес) и короткими сезонами дождей обуславливает формирование сообществ с доминированием невысоких (до 8–10 м) мелколиственных листопадных колючих деревьев, а также кустарников с многочисл. шипами и колючками на стволах и ветвях. Мн. деревья имеют своеобразную форму. Особенно оригинальны бутылочные деревья *Chorisia crispiflora* и *Cavanillesia arborea* (сем. баобабовых) с утолщёнными, запасующими воду стволами диаметром до нескольких метров и деревья с зонтиковидными кронами, напр. унаби (*Ziziphus joazeiro*) из сем. крушиновых, *Spondias lutea* из сем. сумаховых. Кроме того, для К. характерны: листовые и стеблевые суккуленты – кактусы [цереусы](#), [опунции](#), перескии (*Pereskia*), некоторые виды мелокактусов (*Melocactus*) и др., а также [агавы](#), представители сем. молочайных (*Manihot dichotoma*, *Manihot glaziovii*), неэпифитных бромелиевых (*Hohenbergia catingae*); ксерофильные многолетние травы (злаки, осоковые, Пуа из сем. бромелиевых); в короткие сезоны дождей обильны однолетники. К. занимает ок. 10% территории Бразилии.