

КАМЕНКИ

Авторы: В. М. Лоскот



Фото Stephan Skaarup Lund
Обыкновенная каменка.

КАМЕНКИ (*Oenanthe*), род наземных птиц сем. дроздовых. Длина 13,5–18 см; масса от 12 (кипрская каменка, *Oe. cyprica*) до 44 г (белохвостая каменка, *Oe. leucoga*); самцы несколько крупнее самок. Тело стройное, крылья длинные; хвост обычно короткий, прямосрезанный; ноги высокие. Поясница, надхвостье и основания рулевых перьев белые или рыжие, а вершины рулевых перьев, как правило, чёрные. Брачная окраска самцов

большинства видов пёстрая, контрастная; включает чёрный, бурый, рыжий, розоватый и белый цвета; самки менее яркие, буроватые; молодые птицы пятнистые. По земле передвигаются широкими прыжками, часто приседают, взмахивая крыльями и хвостом. Ок. 22 видов К. населяют гл. обр. аридные горы, степи и пустыни Евразии и Африки; лишь обыкновенная каменка (*Oe. oenanthe*), гнездящаяся в Старом Свете от Средиземноморья и Монголии до арктич. островов, проникла также в Сев. Америку. В горах селятся до выс. 4500 м; имеются оседлые и перелётные виды. В России гнездятся обыкновенная каменка, каменка-плясунья (*Oe. isabellina*), плешанка (*Oe. pleschanka*), чернопегая (*Oe. hispanica*) и пустынная (*Oe. deserti*) каменки. Питаются членистоногими, реже семенами, ягодами и мелкими пресмыкающимися. Чашевидное гнездо укрывают в нишах среди камней, расщелинах скал, норах, дуплах или постройках. В кладке обычно 5–6 яиц; насиживает самка 13–14 сут. Выводок кормят оба родителя; молодые покидают гнездо через 11–14 дней после вылупления, способность к полёту приобретают в возрасте 3 недель.