

КАМЫШНИЦА

Авторы: В. М. Лоскот



Камышница обыкновенная.

Фото Helge Sørensen

КАМЫШНИЦА обыкновенная, болотная курочка, водяная курочка (*Gallinula chloropus*), птица сем. пастушковых. Наиболее широко распространённый представитель одноим. рода, включающего 8 видов в осн. тропич. птиц. Длина до 38 см, масса до 500 г. Голова небольшая, на лбу кожистая красная бляшка; клюв относительно короткий, красный с жёлтой вершиной. Хвост короткий; ноги и пальцы длинные, зеленоватые. Окраска оперения

черновато-серая; спина и крылья с бурым оттенком, на боках белые пестрины.

Характерна значит. географич. изменчивость окраски и размеров (выделяют ок. 12 подвидов). К. обитает на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, гнездится от 65° с. ш. (Юж. Скандинавия) до 35° ю. ш. (Юж. Америка); в горах – до выс. 4200 м (Анды). Населяет заросшие пресные водоёмы и реки с медленным течением.

Плывущая К. ритмично «кивает» головой, при ходьбе подёргивает хвостом. Всеядна; преобладание в рационе растительной (побеги и семена) или животной (гл. обр. беспозвоночные) пищи зависит от места обитания. Глубокое чашевидное гнездо К. строит на заламах камыша или тростника, иногда на кустах и деревьях в гнёздах др. видов птиц. В кладке 2–13 (чаще 5–10) яиц, насиживает преим. самка (19–22 дня). Молодые особи приобретают способность к полёту в возрасте 35–50 дней. В сезон обычно 2 (в тропиках 3) выводка.