

КАНАРЕЕЧНЫЕ ВЬЮРКИ

Авторы: В. М. Лоскот



Фото Helge Sørensen

Обыкновенный канареечный вьюрок.

КАНАРЕЕЧНЫЕ ВЬЮРКИ (*Serinus*), род птиц сем. вьюрковых. Длина от 10 см (белопоясничный К. в., *S. leucopygius*) до 18 см (толстоклювый К. в., *S. burtoni*), масса 10–30 г. У большинства видов клюв конический, короткий, вздутый; крылья острые или притупленные; хвост ср. длины, реже удлинённый, с вырезкой на вершине; цевка относительно короткая. В окраске оперения преобладают зелёный, жёлтый, бурый и серый тона в сочетании с тёмными продольными пестринами; поясница обычно окрашена ярче спины. Возрастной

диморфизм окраски выражен более резко, чем половой. Ок. 39 видов; 31 из них населяет Африку и прилежащие острова, 2 вида – эндемики Аравийского п-ова, 6 видов встречаются гл. обр. в Юж. Евразии. Места обитания разнообразны: от пустынь и саванн до влажных тропич. лесов; в горы поднимаются до альпийского пояса (4600 м, Гималаи). Образ жизни типичен для представителей семейства. В России гнездятся обыкновенный (*S. serinus*) и красношапочный (*S. pusillus*) К. в. В 19–20 вв. обыкновенный К. в. стремительно расселился из Юж. Европы на северо-восток и достиг зап. областей России (гнездится в Калининградской, Псковской областях и на юге Ленинградской обл.). Вид отличают мелкие размеры (длина 11,5 см, масса 10–14 г) и интенсивно жёлтые участки на голове, груди и пояснице, характерные для брачного оперения самцов. Предпочитает леса (особенно сосновые), парки и сады, не избегает крупных городов. Юж. популяции оседлы, северные – зимуют в Средиземноморье. Близкий вид – канарский К. в., или *канарейка*. В Красную книгу

МСОП 3 вида К. в. внесены как уязвимые, 1 вид – как находящийся под угрозой исчезновения.