

КВАКШИ

Авторы: Б. Д. Васильев



Обыкновенная квакша.

Фото Н. Б. Ананьевой

КВАКШИ (Hylidae), семейство бесхвостых земноводных. Длина тела 2–13,5 см. Позвонки передневогнутые, поперечные отростки крестцовых позвонков слегка расширены. Концы пальцев снабжены дисками, способствующими передвижению по вертикальным и гладким поверхностям. Окраска очень изменчива даже в пределах одной популяции. Кроме того, К. могут быстро изменять её в зависимости от температуры и влажности среды. Ок. 830 видов.

Населяют умеренные и тропич. леса Сев. и Юж. Америки, Сев. Африки, Евразии и Австралии. В Европ. части России встречается обыкновенная квакша (*Hyla arborea*), на Дальнем Востоке – дальневосточная квакша (*H. japonica*). Обитают гл. обр. на деревьях, имеются также водные формы. В дневное время древесные К. могут высухать более чем на 60% без вреда для себя; восстанавливают водный баланс за счёт вечерней росы, во время дождя или посещая водоёмы. Некоторые тропич. виды (*Phyllomedusa* sp.) для снижения влагопотерь смазывают тело восковыми секретами спинных желёз. К. питаются разл. беспозвоночными, гл. обр. насекомыми. Икру откладывают в водоёмы, дупла деревьев, пазухи листьев или подвешивают пенные комки икры в нависающих над водой ветвях, откуда вылупляющиеся личинки падают в воду, где продолжают своё развитие. У некоторых видов самки вынашивают икру на спине открыто или в спец. «сумке» ([сумчатые квакши](#)).