



КВѢНКЕ ОТѢК

КВѢНКЕ ОТѢК (ангионевротический отѢк, гигантская крапивница), острый, внезапно развившийся огранич. отѢк кожи и подкожной клетчатки и/или слизистых оболочек. Чаще наблюдается у женщин. Описан в 1882 Г. И.

КвѢнке. Различают аллергический (часто сочетающийся *скрапивницей* и др. аллергич. болезнями) и псевдоаллергический (возникает вследствие воздействия физич., термич. или химич. факторов) К. о. Важную роль в развитии К. о. играют наследств. и нервно-рефлекторные факторы. Внешне К. о. проявляется резко отграниченной отѢчностью тканей (гл. обр. губ, век, щѢк), иногда кожными высыпаниями в месте отѢка, обычно без зуда и боли. Длительность К. о. – неск. часов или дней. Наиболее опасен отѢк гортани (20–25% случаев), длящийся от 3 до 30 мин (возможен летальный исход от асфиксии). ОтѢк слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта проявляется резкой болью в животе, рвотой, поносом при отсутствии изменений кожи и видимых слизистых оболочек. Прогноз при К. о. обычно благоприятен. Лечение: антигистаминные средства; при отѢке гортани – срочная госпитализация в отделение интенсивной терапии или реанимации.