

КИПРЕЙ

Авторы: Л. И. Крупкина



Рис. Е. Н. Федорченко
Кипрей волосистый.

КИПРЕЙ (*Epilobium*), род многолетних, реже однолетних трав сем. кипрейных. Стебель выс. до 130 см, иногда при его основании формируются нитевидные побеги, на верхушке которых к осени образуются шаровидные зимующие почки, или стелющиеся и укореняющиеся облиственные побеги. Листья очередные или супротивные, цельные, обычно более или менее зубчатые. Цветки четырёхчленные, розовые, красные или белые, в верхушечных кистевидных соцветиях или пазушные, одиночные. Плод – вытянутая стручковидная коробочка, вскрывающаяся створками сверху вниз. Семена многочисленные, с хохолком из длинных волосков. Ок. 200 видов, распространённых практически по всему земному шару, но преим. в умеренно тёплых областях. В России более 30 видов,

встречающихся почти повсеместно в сырых и заболоченных лесах, зарослях кустарников, на лугах, по берегам водоёмов, окраинам болот, обочинам дорог (К. болотный, *E. palustre*, К. волосистый, *E. hirsutum*, и др.); в альпийском поясе гор распространён К. альпийский (*E. alpinum*). Мн. К. – лекарственные (содержат флавоноиды, фитостерины, дубильные вещества, алкалоиды, витамин С), пищевые (К. четырёхгранный, *E. tetragonum*, молодые листья пригодны для салатов), кормовые, медоносные и декоративные (К. волосистый) растения.

