

КОБЧИК

Авторы: В. М. Лоскот



Кобчик (молодая самка).

Фото Helge Sørensen

КОБЧИК (*Falco vespertinus*), птица рода соколы сем. соколиных. Длина 27–31 см, масса 120–197 г; самки несколько крупнее самцов. Взрослый самец серовато-чёрный с красновато-рыжим оперением нижней части брюшка, подхвостья и бёдер. У самки спина, надхвостье и хвост серые с тёмными поперечными полосами, «шапочка» и низ охристые, бока головы и горло белые, «усы» чёрные. Молодая птица похожа на самку, но верх тела тёмно-бурый с рыжими

каймами, образующими чешуйчатый рисунок, низ более светлый с продольными коричневатыми пятнами. Восковица, кольцо вокруг глаза и ноги у взрослых птиц красные, у молодых – желтоватые. К. населяет лесную, лесостепную и степную зоны Евразии от Центр. Европы до долины р. Лена; в горах до выс. 1500 м. Предпочитает открытые пространства с вкраплением лесных участков, парки и сады. Зимует в Юж. Африке, совершает миграции стаями. Добычу ловит на земле и в воздухе. Осн. кормом служат крупные насекомые (гл. обр. прямокрылые, стрекозы и жуки); птенцам приносят преим. мелких грызунов, ящериц, лягушек и птиц. К. гнездятся отд. парами или колониями до нескольких сотен пар, используя пустующие гнёзда врановых и хищных птиц, реже дупла, норы и ниши в обрывах. В кладке 2–6 яиц (обычно 3–4); насиживают оба родителя 22–23 сут. Птенцы приобретают способность к полёту в возрасте 27–30 дней. Один выводок в сезон. К. внесён в Красную книгу МСОП как вид, состояние которого близко к угрожаемому. На юге Вост. Сибири, в Сев.-Вост. Китае и Корее гнездится близкий вид – амурский кобчик (*F. amurensis*).