

# КОЗОДОИ

Авторы: В. М. Лоскот



Каролинский козодой (*Caprimulgus carolinensis*).

Фото Б. А. Козинцева

КОЗОДОИ настоящие (*Caprimulgidae*), наиболее крупное семейство птиц отр. козодоеобразных. Длина 15–41 см (до 80 см у некоторых видов с необычайно удлинёнными рулевыми перьями); масса от 30 (карликовый козодой, *Chordeiles pusillus*) до 150 г (большой ушастый козодой, *Eurostopodus macrotis*). Клюв гибкий; ноздри в роговых трубочках. Зев широкий; в углах рта большинства К. расположены длинные упругие щетинки. Крылья обычно длинные, острые; хвост разл. длины и формы. Ноги короткие, слабые; цевка частично оперена; наружный

палец не отводится назад; коготь среднего пальца имеет боковые зазубрины.

Окраска оперения варьирует от почти чёрной до желтовато-серой с тёмными и светлыми полосками, пятнами и штрихами; они образуют сложный пёстрый рисунок, сливающийся с корой деревьев или почвой. У ряда видов имеются серые и рыжие морфы. Самцы несколько крупнее самок, нередко их отличают крупные белые пятна на вершинах маховых и рулевых перьев, а также резко удлинённые украшающие перья в крыльях и хвосте. Полёт лёгкий, бесшумный; по земле птицы передвигаются с трудом. Большинство К. оседло обитают в тропич. поясе, немногие перелётные виды гнездятся в умеренных широтах (на север до 60°–64° с. ш.); отсутствуют на б. ч. Вост. Сибири, в Новой Зеландии и на многих океанич. островах. Часть особей белогорлого козодоя (*Phalaenoptilus nuttallii*), гнездящихся в зап. штатах США, проводит зиму в расщелинах скал и обрывов, впадая в оцепенение. При этом темп-ра тела птиц снижается с 41 до 18 °С. Кратковременное оцепенение при резком похолодании

известно и у др. представителей семейства. К. селятся в лесах, степях и пустынях, на равнине и в горах (до выс. 3300 м); предпочитают разреженные древесные и кустарниковые насаждения, чередующиеся с открытыми пространствами. 3 подсемейства: американские К. (Chordeilinae, 4 рода, 10 видов), южноазиатские, или ушастые, К. (Eurostopodinae, 1 род, 7 видов) и настоящие К. (Caprimulginae, 11 родов, ок. 72 видов). В России распространены 2 вида. Обыкновенный козодой (*Caprimulgus europaicus*) гнездится от зап. границ страны до Забайкалья. Длина 25–28 см, масса 65–100 г. Оперение буровато-серое с продольными тёмными пестринами и 2 белыми пятнами по бокам горла. В лесной зоне селится гл. обр. на опушках и вырубках. Зимует в Юж. Африке и Индии. Питается преим. ночными насекомыми (особенно бабочками и жуками), которых ловит в воздухе. Народное название «козодой» связано с частым появлением птиц в сумерках вблизи стад, куда их привлекает обилие потревоженных насекомых. Гнёзда не строят; самка откладывает 2 яйца (редко 3) на землю или пенёк. Насиживают оба родителя 17–18 дней, птенцы приобретают способность к полёту в возрасте 16–17 дней. На юге ареала 2 выводка за сезон. Большой козодой (*Caprimulgus indicus*) обитает в Юго-Вост. Сибири и Юж. Приморье.