



# КОККОМИКОЗ КОСТОЧКОВЫХ

Авторы: В. В. Мазин

---

КОККОМИКОЗ КОСТОЧКОВЫХ, болезнь косточковых плодовых культур (гл. обр. вишни и черешни), вызываемая сумчатым грибом *Succomyces hiemalis*. Распространена в США и во многих европ. странах; в РФ – в Европ. части страны (Калининградская обл. и др.), наносит существенный экономич. ущерб. Заражение происходит посредством сумкоспор и конидий возбудителя. Развитию болезни способствует тёплая влажная погода. На листьях, плодах и плодоножках поражённых растений появляются мелкие красно-коричневые пятна, с нижней стороны листьев пятна покрыты розоватым налётом из конидий патогена. По мере развития болезни пятна увеличиваются, сливаются в более крупные, затем листья желтеют и преждевременно опадают, что ослабляет растения. Поражённые плоды засыхают, уменьшается урожай и ухудшается его качество. К. к. снижает зимостойкость растений и устойчивость к др. фитопатогенам; сильное поражение в течение ряда лет приводит к гибели растений. Инфекция сохраняется на опавших листьях. Меры защиты: использование устойчивых сортов, уничтожение опавших листьев, опрыскивание фунгицидами (ранневесеннее и при появлении первых признаков заболевания).