

КОНЬКИ

Авторы: В. М. Лоскот



Лесной конёк.

Фото Helge Sørensen

КОНЬКИ (*Anthus*), род птиц сем. трясогузковых отр. воробьинообразных. Длина 13–21 см; масса от 13 (пятнистый конёк, *A. hodgsoni*) до 40 (степной конёк, *A. richardi*) г. Стройные птицы с удлинённым телом, небольшой головой и короткой шеей. Клюв тонкий и острый. Крылья заострённые с удлинёнными третьестепенными маховыми перьями. Хвост ср. длины или длинный, прямой или с неглубокой вырезкой. Ноги тонкие, коготь заднего пальца у наземных видов прямой, длинный. Брачное (летнее)

оперение сверху серовато-бурое или зеленоватое, снизу белое или охристое, у большинства видов с тёмно-бурыми продольными пестринами. Крылья и хвост тёмно-бурые, одна-две внешние пары рулевых перьев с белыми полями. Молодые птицы обычно похожи на взрослых в брачном наряде. По земле ходят и бегают (не прыгают в отличие от большинства воробьинообразных), часто подрагивают хвостом. Ок. 43 видов; встречаются от арктич. тундр до субантарктич. островов; в горах селятся до выс. 5300 м (Гималаи). Наибольшего видового разнообразия достигают в Африке и Евразии. Населяют гл. обр. открытые или полуоткрытые ландшафты. Имеются оседлые и перелётные виды. В России гнездятся 12 видов; широко распространены полевой (*A. campestris*), лесной (*A. trivialis*), пятнистый, луговой (*A. pratensis*), краснотазый (*A. cervinus*) и горный (*A. spinoletta*) коньки. Питаются гл. обр. насекомыми, пауками и ракообразными, а также семенами. Моногамы. Самцы часто поют в токовом полёте. Чашевидное гнездо укрывают в ямке среди травы, часто у основания кочки, кустика или нависающего камня. В кладке 2–7 (обычно 4–5) яиц;

насиживает самка 11–14 дней; молодые покидают гнездо через 10–14 дней после вылупления. В сезон 1–2, редко 3 выводка. В Красную книгу МСОП внесены 7 видов К., одному из них (*A. sokokensis* из Вост. Африки) угрожает вымирание, 3 уязвимы.