

КОРИЧНИК

Авторы: Г. П. Яковлев



Коричник цейлонский. Цветущий побег и кора ветвей (внизу слева).

КОРИЧНИК (*Cinnamomum*), род вечнозелёных деревьев и кустарников сем. лавровых. Листья простые, преим. супротивные, обычно кожистые, с характерным трёхнервным жилкованием. Цветки обоеполые, чаще с зеленоватым или жёлтым околоцветником. Плоды голубовато-чёрные, сидящие в маленькой купуле (видоизменённом цветоложе). 250–300 видов, распространённых в тропич. и субтропич. лесах Океании, Австралии, Азии и Америки. В вегетативных органах большинства видов присутствуют секреторные клетки, содержащие эфирное масло, которое придаёт коре, листьям и древесине приятный пряный запах. Наиболее известен К. цейлонский (коричное дерево цейлонское, *C. zeylanicum*, *C. verum*), естественно произрастающий и культивируемый в Юж. Индии и на о. Шри-Ланка; из коры ветвей и молодых стволов,

находящейся под перидермой, получают ценную пряность – корицу настоящую (или цейлонскую). К. китайский, или кассия (*C. cassia*), известен лишь в культуре как источник менее ценной корицы, а также т. н. почки кассии – пряности, получаемой из незрелых плодов; разводят в Юж. и Юго-Вост. Азии, Лат. Америке. К. камфорный, или камфорный лавр (*C. camphora*), – крупное дерево, произрастающее и

культивируемое на юге континентального Китая, на о. Тайвань, в Юж. Японии и Сев. Вьетнаме, используется для получения природной камфоры. В России К. камфорный и ряд др. видов разводят на Черноморском побережье Кавказа как декоративные растения в садах и парках.