

КРАБОЕД

Авторы: К. А. Жариков



Фото Michael Cameron
Крабоед.

КРАБОЕД, тюлень-крабоед (*Lobodon carcinophagus*), млекопитающее сем. настоящих тюленей отр. ластоногих. Длина тела 2,2–2,6 м, масса до 300 кг, самки немного крупнее самцов. Тело и морда умеренно вытянутые.

Многовершинные зубы верхней и нижней челюстей тесно смыкаются, в результате чего образуется «решётка», позволяющая фильтровать пищу. После ежегодной линьки (в

январе – марте) мех молодых К. на спине серо-коричневый, с пятнами и кольцами на боках, плечах и ластах, на брюхе – светло-серый; к лету мех выцветает до кремово-белого. С возрастом окраска К. бледнеет, контраст между спиной и брюхом исчезает. К. распространены в водах Антарктики циркумполярно; держатся границы пакового льда и мигрируют при её сезонном изменении. Питается обычно в ночное время, гл. обр. крилем, реже рыбой и донными ракообразными, за которыми способен нырять на глубину более 400 м, проводя под водой до 11 мин. По суше передвигается быстро (до 25 км/ч), может выпрыгивать из воды на высокие льдины и скалы. На льду (реже на побережьях) образует залёжки до 3 тыс. голов. Естеств. враги К. – косатка и морской леопард. Промыслового значения не имеет, является самым многочисл. видом тюленей в мире.