

КУБЫШКА

Авторы: Л. И. Крупкина



Кубышка жёлтая.

КУБЫШКА (*Nuphar*), род водных многолетних корневищных трав сем. нимфейных. Листья очередные, трёх типов: плавающие (на длинных черешках, сердцевидно-эллиптические, длиной до 35 см, почти кожистые); подводные (на коротких черешках, сердцевидно-стреловидные, полупрозрачные, волнистые по краю); видоизменённые в пучок нежных разветвлённых волосков. Цветки одиночные, крупные (до 6 см в диаметре), жёлтые или оранжевые, на длинных цветоножках. Плоды ягодообразные, бутыльчатой или яйцевидно-конич. формы, созревают и разрушаются под водой, освобождая многочисл. семена. 10–12 (25) видов, распространённых в умеренно тёплых областях Сев. полушария. В России 3 вида, из которых наиболее обычна К. жёлтая (*N. lutea*), произрастающая в Европ. части и Сибири. Она

образует обширные заросли в пресноводных озёрах, старицах и реках со стоячей или медленно текущей водой. Выделяя биологически активные вещества, препятствует «цветению» воды и развитию патогенных микроорганизмов, обеспечивает определённый кислородный баланс водоёмов, особенно в зимний период, поскольку подводные листья остаются зелёными круглый год. Корневища используются в медицине, служат сырьём для произ-ва противозачаточного средства. Нередко К. применяют для озеленения водоёмов. На Дальнем Востоке К. жёлтая замещается К.

японской (*N. japonica*), находящейся под угрозой исчезновения (внесена в Красную книгу РСФСР).