

КУКАБАРА

Авторы: В. М. Лоскот



Синекрылая кукабара.

Фото В. В. Климова

КУКАБАРА, кукабарра (*Dacelo*), род птиц сем. зимородковых. 4 вида. Длина от 27,5 см (краснобрюхая К., *D. gaudichaud*) до 46 см (смеющаяся К., или зимородок-великан, *D. novaeguineae*), масса до 470 г. Голова крупная; клюв массивный, надклювье с небольшим крючком, темнее подклювья. Крылья широкие, хвост относительно длинный. Окрашены пёстро; в оперении присутствуют белые, бурые, чёрные, тёмно-синие и яркие лазурные или рыжеватокрасные тона. У самцов краснобрюхой К. и синекрылой К. (*D. leachii*) хвост тёмно-синий, у самок он рыжий с тёмными

полосами и белой вершинной каймой. Смеющаяся К. населяет Вост. Австралию, завезена в её зап. часть, на Северный о. Новой Зеландии, острова Тасмания, Кенгуру и Флиндерс. Синекрылая К. обитает на севере Австралии и в Новой Гвинее, где встречаются также краснобрюхая К. и аруанская К. (*D. tyro*), гнездящиеся также на некоторых прилежащих островах. К. предпочитают сухие редколесья и тропич. леса; смеющаяся К. охотно селится в гор. садах и парках. К. ведут оседлый образ жизни, встречаются парами и семейными группами (до 14 птиц). Питаются насекомыми, ракообразными и рыбой; в рационе крупных видов, живущих вдали от водоёмов, обычны пресмыкающиеся (особенно змеи), птицы (разоряют гнёзда) и мелкие зверьки. Голос К. громкий и резкий; у смеющейся К. и синекрылой К. он похож на хохот; характерны групповые «хоры», особенно на рассвете и закате. Гнездятся в дуплах или древесных термитниках на выс. до 60 м, иногда в норах. В кладке обычно 2–4

яйца; насиживают ок. 3–4 нед; выводок кормят до 40 дней. В году 2 кладки.

У смеющейся К. молодые самки остаются с родителями 1–2 года, самцы – до 4 лет; они помогают взрослым птицам защищать территорию, насиживать кладку и кормить выводок.