



КУНИЦЫ

Авторы: Н. А. Щипанов

КУНИЦЫ (*Martes*), род млекопитающих сем. куньих. Длина тела 40–50 см, у *харзы* до 80 см, длина хвоста 34–42 см. Тело стройное, вытянутое, гибкое, лапы короткие, широкие. Голова относительно крупная, морда клиновидная, резко сужается к носу. мех высокий, мягкий, пушистый. Окраска большинства видов одноцветная, бурая или коричневая, на груди светлое пятно. 8 видов: американский соболь (*M. americana*), *илька*, каменная К. (*M. foina*), лесная К. (*M. martes*), нилгерийская К. (*M. gwatkinsii*), *соболь*, харза, японская К. (*M. melampus*). Распространены в лесных областях Евразии (включая Большие Зондские о-ва) и Сев. Америки; в горы поднимаются до выс. 4000 м. Подвижные, ловкие животные, прекрасно лазают по деревьям, но б. ч. жизни проводят на земле. Хищники; основу питания составляют мелкие млекопитающие, гл. обр. лесные полёвки; большое значение имеют также насекомые, ягоды, сочные плоды, орехи. Большинство видов оседлые; ведут одиночный образ жизни. Гон проходит летом, детёныши (1–7) рождаются в начале следующего лета. Половой зрелости достигают в двухлетнем возрасте.

В России распространены соболь, харза, лесная К. и каменная К. Последние два вида различаются между собой цветом горлового пятна: у лесной К. оно жёлтое (поэтому её называют также желтодушкой), у каменной – белое (белодушка). Зимний мех лесной К. более густой, мягкий, красивый. Лесная К. обитает в разл. лесных биотопах; убежища обычно находит в дуплах деревьев. Каменная К. предпочитает безлесные склоны, ущелья, осыпи (убежища устраивает в расселинах скал, в пустотах среди камней, в дуплах). Заходя в лесостепь, селится в старых дубравах. В европ. части ареала стала синантропным видом, нередко обитает в каменных постройках населённых пунктов. В местах совместного обитания между соболем и лесной К. в процессе скрещивания образуются гибриды – *кидусы*. Лесная К. и каменная К. между собой не скрещиваются.

Численность К. во многом определяется численностью мышевидных грызунов. Все представители рода – важные объекты пушного промысла; наиболее ценный мех у соболя и лесной куницы.