



# КУРООБРАЗНЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот

---

КУРООБРАЗНЫЕ (Galliformes), отряд птиц. Древняя группа, обособившаяся, возможно, уже в меловой период; ископаемые остатки датируются начиная с нижнего эоцена. Вместе с [гусеобразными](#) К. выделяют в надотряд Galloanserimorphae. Длина от 12–15 см (расписной перепел, *Coturnix chinensis*) до 3 м (зелёный павлин, *Pavo muticus*), масса от 20–50 г до 10 кг (индейка обыкновенная, *Meleagris gallopavo*). Телосложение плотное, коренастое; голова небольшая; шея короткая. Клюв короткий, крючковатый, с выпуклым надклювьем, тупой вершиной и заострёнными краями рамфотеки. Крылья широкие, закруглённые, с 10 первостепенными маховыми. Хвост разл. длины (у некоторых [фазанов](#) до 2,3 м) и формы, рулевых перьев 6–12 пар. Ноги крепкие, сильные, четырёхпалые. Киль грудины высокий, относительно короткий, грудная мускулатура мощная. Хорошо развиты зоб, мускульный желудок и парные слепые кишки. Кольца трахеи окостеневают. Контурное оперение плотное, с побочным стержнем и пуховой частью у основания пера; пух редкий, расположен на аптериях. Окраска оперения разнообразна: от серовато-бурой, криптической до необычайно яркой и блестящей; на голове часто имеются ярко окрашенные участки голой кожи и выросты («брови», «гребни», «серёжки», «бородки»). Самцы обычно крупнее самок и ярче окрашены.

6 семейств: [большеноги](#), [краксовые](#), [цесарковые](#), зубчатоклювые куропатки (*Odontophoridae*), [тетеревиные](#), [фазановые](#); 80 родов, ок. 288 видов. Распространены на всех материках, исключая Антарктиду и некоторые океанич. острова; обитают от тропич. лесов и пустынь до арктич. и горных тундр (до выс. 5800 м); предпочитают лесные и кустарниковые заросли. Активны гл. обр. днём; ведут наземный или наземно-древесный (краксовые) образ жизни. Хорошо ходят и быстро бегают; обладают стремительным взлётом, но летают, как правило, плохо и на короткое расстояние. Оседлые или кочующие птицы, лишь 2 вида перепелов (род *Coturnix*)

совершают сезонные перелёты. Взрослые К. преим. растительноядные, в рационе птенцов преобладают мелкие беспозвоночные. Моногамы и полигамы. Гнёзда устраивают на земле, редко (краксовые) на деревьях. В кладке 2–27 яиц (чаще 7–12); насиживают (обычно самка) 14–34 дня; у большеногов инкубация яиц продолжается ок. 2 мес. Птенцы выводкового типа. Большинство К. – традиц. объект охоты; неск. видов одомашнены (банкивская курица, индейка, цесарка), других часто держат как декоративных птиц. В Красной книге МСОП числится 68 видов К., из них 3 истреблены (один сохранился в питомниках), 5 видов находятся в критич. состоянии, 20 – под угрозой исчезновения, 40 – уязвимы. В Красную книгу РФ внесены 2 вида и 2 подвида курообразных.