

ЛАПОНОИДНАЯ РАСА

Авторы: А. П. Пестряков



Лапоноидная раса. Саамка. Фото 1900-х гг. Отдел рукописей и архивов Публичной библиотеки (Нью-Йорк).

ЛАПОНОИДНАЯ РАСА, малая раса; рассматривается как контактная (европеоидно-монголоидная) раса или как арктич. вариант большой [европеоидной расы](#). Близка к [уральской расе](#), от которой отличается менее выраженной монголоидностью (ряд антропологов считают её вариантом уральской расы). Характерны низкий рост, брахиморфное телосложение, соответствующее адаптивному типу полярных популяций. Волосы прямые и мягкие (в отличие от жёстких монголоидных волос), обычно русых оттенков. Кожа всегда светлая, третичный волосяной покров слабый. Череп по европеоидным масштабам небольшой величины, брахикранный, с низким сводом и

слабовыраженным надбровьем. Лицо ортогнатное, имеющее слабую или среднюю горизонтальную профилировку. Глаза смешанных или тёмных оттенков, встречаются светлые. Складка верхнего века обычно выражена, встречается эпикантус (обычно у детей и женщин). Переносье среднее или низкое, профиль спинки носа часто вогнутый. Подбородок выступает слабо. Верхняя губа прохейличная. Слизистые губ тонкие или средние.

В относительно чистом виде представлена среди [саамов](#) (лопарей – отсюда назв. «Л. р.») Кольского п-ова, Сев. Финляндии и Норвегии. К югу от этого ареала черты Л. р. прослеживаются в виде вкраплений среди представителей [беломоро-балтийской расы](#).

