

# ЛЕНИВЦЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Трёхпалый ленивец (*Bradypus tridactylus*).

Фото Arthur Anker

ЛЕНИВЦЫ, общее название для двух различных по происхождению, но конвергентно схожих семейств отр. неполнозубых; ранее их рассматривали как 2 рода одного семейства.

Для представителей обоих семейств характерны округлая голова, маленькие уши; глаза направлены вперёд. Хвост короткий или практически отсутствует; конечности длинные, передние длиннее задних; кисть и стопа узкие, изогнутые. Пальцы сросшиеся; когти большие, отдельные; у трёхпалых Л. (сем. Bradypodidae; 1 род, 4 вида) на передних и задних

конечностях по 3 пальца, у двупалых Л. (сем. Megalonychidae; 1 род, 2 вида) на передних конечностях 2 пальца, на задних – 3. Длина тела двупалых Л. 60–64 см и более, масса до 9 кг; трёхпалые Л. мельче: длина тела 50–60 см, масса 4–5 кг. Мех густой, грубый, на туловище растёт в направлении от брюха к спине; окраска желтовато-белая или буроватая, с зеленоватым оттенком (из-за водорослей, поселяющихся в волосах). Л. распространены во влажных тропич. лесах Центр. и Юж. Америки. Древесные животные; обычно висят на ветвях спиной вниз, на землю спускаются редко; передвигаются медленно и неуклюже; некоторые Л. хорошо плавают и во время периодич. половодий могут перемещаться на относительно большие расстояния. Питаются гл. обр. листьями, молодыми побегами и плодами деревьев. Желудок объёмный, многокамерный. Уровень обмена веществ почти в два раза ниже, чем у млекопитающих такого же размера. Темп-ра тела колеблется от 24° до 30–33°. Л. активны преим. ночью. Живут поодиночке на небольших участках;

животное может провести б. ч. жизни перемещаясь на одном или нескольких соседних деревьях. Беременность 4–6 мес, самка рождает одного крупного детёныша длиной ок. 20 см и носит его на груди. Продолжительность жизни Л. в неволе до 23 лет. В Красную книгу МСОП внесены 2 вида Л. из рода *Bradypus*, находящиеся под угрозой исчезновения.