



ЛЕНКОРАНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

ЛЕНКОРАНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, в Азербайджане, в Закавказье. Протягивается на 100 км вдоль подножия Талышских гор по побережью Каспийского м., от которого отделена полосой невысоких песчаных дюн. Представляет собой узкую (от 5 км на юге до 30 км на севере) пологонаклонную террасированную (4 мор. террасы) равнину, сложенную глинами, суглинками, песками и галечниками. В вост. части много небольших пресных и солоноватых озёр (т. н. морцы) и тростниковых болот. Климат влажный субтропический с жарким летом (ср. темп-ра июля ок. 26 °С) и тёплой зимой (ср. темп-ра января от 0 до 3 °С). Осадков выпадает ок. 1100–1700 мм в год (максимум зимой). Особенность природных ландшафтов Л. н. – массивы широколиственных лесов с преобладанием реликтовых видов гирканской флоры (каштанолистный дуб, железное дерево, гледичия, лапина, ольха, лианы) на желтозёмах и желтозёмно-подзолистых почвах; б. ч. лесов вырублена. Для культурного ландшафта Л. н. характерны рисовые чеки, плантации табака и чая. Развито земледелие и садоводство (цитрусовые, хурма, фейхоа, тунг и др.). В сев.-вост. части Л. н. и прилегающей акватории Каспийского м. (зал. Кызылагадж) – Кызылагаджский заповедник.