



МАНАКИНОВЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот

МАНАКИНОВЫЕ (Pipridae), семейство птиц отр. воробьинообразных. Родственны котинговым и тирановым. Небольшие (длина 7–16,5 см, масса 6–40 г) древесные птицы коренастого телосложения. Крылья короткие, закруглённые; хвост обычно короткий, прямой, закруглённый или ступенчатый. У некоторых видов 1–4 средние пары рулевых перьев длинные, заострённые или лишены опахал (нитехвостая пипра, *Pipra filicauda*). Клюв короткий, массивный, широкий у основания, с небольшим крючком. Цевки длинные, 1-й и 2-й пальцы наполовину сросшиеся. Самцы обычно окрашены очень ярко, у многих из них в оперении сочетается блестящий чёрный цвет с белым, красным, голубым, синим, жёлтым и оранжевым или преобладает зелёный цвет; оперение самок гл. обр. зеленоватое. Часто ярко окрашены также хохлы, бороды, радужная оболочка глаз и ноги. 13 родов и 48 видов. Наибольшего видового разнообразия М. достигают во влажных равнинных тропич. лесах Юж. Америки, часть видов обитает в субтропич. горных лесах и кустарниках (в Андах до выс. 2400 м), некоторые проникли в Центр. Америку, на север до Мексики. Оседлые птицы. Питаются мелкими сочными плодами, срывая их на лету, насекомыми и пауками. Полигамы. Самцы токуют поодиночке и группами (до 70 особей), обычно на ветвях деревьев, реже на земле. Они привлекают самок своеобразными позами, прыжками, танцами и полётами, которые сопровождаются громкими звуками, в т. ч. издаваемыми видоизменёнными маховыми перьями. Строят гнёзда, насиживают и заботятся о потомстве исключительно самки. Гнёзда М. обычно небольшие, тщательно свитые, чашеобразные, расположены в развилках тонких горизонтальных ветвей на выс. 0,5–5,0 (до 15) м, нередко над водой лесного ручья. В кладке 2 яйца. Насиживание 17–20 дней; птенцы остаются в гнёздах 13–15 дней. В Красную книгу МСОП внесены 4 вида М., один из них находится в критич. состоянии, 3 – уязвимы.