



ЛОЖНОПРОВОЛОЧНИКИ

Авторы: В. В. Исаичев

ЛОЖНОПРОВОЛОЧНИКИ, общее название личинок жуков из сем. [чернотелок](#) и сем. [пыльцеедов](#) (введено для отличия от настоящих проволочников). Тело личинок цилиндрическое, твёрдое, жёлтое, длиной 2–50 мм. Голова выпуклая сверху, верхняя губа сильно развита, передняя пара ног в 1,5–3 раза длиннее и толще средней и задней пары. Л. живут в почве, гнилой древесине, пищевых продуктах, развиваются в осн. 1–1,5 года. Л., обитающие в почве, распространены гл. обр. в лесостепной и степной зонах, некоторые из них повреждают семена и всходы культурных растений. Наиболее вредоносны личинки песчаного медляка (*Opatrum sabulosum*), кукурузной чернотелки (*Pedinus femoralis*), степного медляка (*Blaps halophila*), дагестанского пыльцееда (*Podonta daghestanica*), пыльцееда-протeya (*Omophlus proteus*) и др. Личинки мучных [хрушаков](#) повреждают зерно, крупу, муку и др. сухие пищевые продукты. О мерах защиты см. в статьях [Проволочники](#), [Вредители зерна и зернопродуктов](#).