



МИЕЛИТ

МИЕЛИТ (от греч. μυελός – костный или спинной мозг, мозговое вещество и *...ИТ*), воспаление спинного мозга. Процесс может распространяться на весь поперечник спинного мозга (поперечный М.) или ограничиваться рассеянными очагами в разл. сегментах (диссеминированный, рассеянный М.). Первичный М. вызывается нейротропными вирусами. Вторичный М. может развиваться как осложнение при инфекциях (бруцеллёз, корь, краснуха, туберкулёз, цитомегалия и др.), после вакцинации (у сенсibilизированных лиц), при травмах позвоночника, локальном воздействии ионизирующего излучения, разл. интоксикациях (отравление свинцом, ртутью, героином и др.). Развитию неврологич. симптомов предшествуют головная боль, лихорадка, боли в спине, руках. Клинич. проявления зависят от локализации М. и характеризуются вялыми параличами и спастич. парезами, нарушениями чувствительности ниже места поражения. Возможны нарушения функции тазовых органов (сначала задержка, а затем недержание мочи и кала), трофич. расстройства (пролежни, отёки, гипергидроз и др.). Диагностика – магнитно-резонансная томография. Лечение: антибиотики, десенсибилизирующие средства, витамины, профилактика пролежней. В восстановит. периоде – массаж, гимнастика, бальнеотерапия, физиотерапия.