



МОЛЛЮСК КОНТАГИОЗНЫЙ

Авторы: Н. Н. Потехаев

МОЛЛЮСК КОНТАГИОЗНЫЙ (моллюск заразительный), вирусный *дерматоз*, возникающий преим. у детей. Описан в 1817 англ. врачами Т. Бейтманом (1778–1821) и У. Р. *Вилланом*. Возбудитель – фильтрующийся вирус, патогенный только для человека. Заражение происходит при контакте с больным или через предметы ухода и гигиены. Инкубац. период – от 2 нед до нескольких месяцев. Характеризуется высыпанием плотных восковидных безболезненных узелков телесного или розовато-бурого цвета, диаметром 2–5 мм, с пупковидным углублением и отверстием в центре, располагающихся обычно на лице, шее и туловище, у взрослых – на гениталиях и прилегающих к ним участках кожи. При сдавливании узелков пинцетом из центр. отверстия выделяется крошковатая масса (т. н. моллюсковые тельца). Лечение заключается в удалении содержимого узелков с помощью пинцета или спец. ложечки с последующей обработкой их настойкой иода. Иногда узелки исчезают спонтанно. При обильных и стойких высыпаниях назначают противовирусные средства. Прогноз благоприятный.

Литература

Лит.: Дерматология: Справочник практикующего врача. М., 2005.