


МОРСКОЙ ЛЕОПАРД

Авторы: К. А. Жариков



Морской леопард.

Рис. Е. Н. Федорченко

МОРСКОЙ ЛЕОПАРД (*Hydrurga leptonyx*), млекопитающее сем. настоящих тюленей.

Единственный вид в роде. Длина до 4 м, масса до 500 кг, самки обычно чуть крупнее самцов.

Длинное стройное тело расширяется в области плечевого пояса. Голова имеет внешнее сходство с головой рептилий, лоб не выражен.

Пасть очень широкая, с крупными клыками, нижняя челюсть массивная, шея длинная и гибкая. Передние ласты достигают $\frac{1}{3}$ длины тела. Окраска спины тёмно-серая, бока и брюхо гораздо светлее, по всему телу разбросаны небольшие пятна неправильной формы (отсюда назв.). М. л. обитает кругополярно в субантарктич. регионах и в зоне дрейфующих льдов Антарктики, подходя к берегам Антарктиды, Австралии, Новой Зеландии, Африки и Юж. Америки. Скоплений не образует. Из воды чаще выходит на лёд, чем на сушу. Питается рыбой, крилем, головоногими моллюсками, нападает на пингвинов и молодых тюленей (чаще в воде). Плавая, совершает мощные синхронные гребки передними лапами, в отличие от др. настоящих тюленей, использующих для этого задние конечности. Размножается на льду, пик щенки в ноябре – декабре. Новорождённые длиной до 1,6 м. Не служит объектом промысла.