

# МРАМОРНЫЙ ЧИРОК

Авторы: В. М. Лоскот



Фото Dick Daniels

Мраморный чирок.

МРАМОРНЫЙ ЧИРОК, узкоклювый чирок (*Marmaronetta angustirostris*), птица сем. утиных. Единственный вид в одноим. роде, который нередко объединяют с речными утками рода *Anas*. Небольшая стройная утка с удлинённым телом (39–48 см), масса 400–590 г; самцы крупнее самок. Голова с небольшим хохолком на затылке (у самки короче или отсутствует); клюв длинный, узкий. В окраске оперения преобладают бледные, серовато-бурые тона; на

голове и шее волнистый рисунок, через глаз к затылку проходит черноватая полоса. Верх более тёмный, со светлыми вершинными пятнами, более крупными и округлыми на плечах и боках тела; низ беловатый, с тёмными поперечными полосами на груди и подхвостье. Клюв тёмный; ноги буровато-зелёные или желтоватые, перепонки чёрные. В окраске молодых преобладают тусклые тона. Распространение очаговое, от Зап. Средиземноморья до Юж. Казахстана, Ср. Азии и Пакистана (между 25° и 46° с. ш.), в горах до выс. 1500 м. Сев. популяции перелётные, зимуют у юж. границ ареала. В связи с резким сокращением численности в последние десятилетия М. ч. исчез из мн. прежних мест размножения, включая низовья Волги. В России возможно гнездование в Прикаспии, гл. обр. в междуречье Терека и Сулака. Селится по берегам лагун, медленно текущих рек, стариц, мелких пресных и солоноватых водоёмов, в т. ч. искусств. происхождения, обычно густо заросших водной и прибрежной растительностью (тростниками, гребенчуком). Поедает семена, клубни и проростки растений, а также червей, моллюсков и водных насекомых. Моногам. Гнездо самка строит недалеко от воды, обычно в неглубокой ямке среди кустов и

травы, выстилает его растит. ветошью и пухом. В кладке 7–14 яиц; насиживает самка 25–27 дней. Внесён в Красные книги РФ и МСОП.