



МУХОЛОВКОВЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот

МУХОЛОВКОВЫЕ (*Muscicapidae*), семейство птиц отр. воробьинообразных. Длина 9–20 см, масса от 6–12 г (белобровая мухоловка, *Ficedula hyperythra*) до 42 г (либерийская чёрная мухоловка, *Melaenornis annamarulae*). Небольшие дендрофильные птицы с вертикальной посадкой, быстрым и манёвренным полётом. Телосложение плотное, голова и глаза крупные, шея короткая. Клюв небольшой или ср. длины, широкий у основания, обычно уплощённый, с резко выпуклым коньком, крючковатый; в углах рта всегда присутствуют жёсткие щетинки. Крылья – от коротких, закруглённых до удлинённых, острых; хвост обычно ср. длины, прямой или с неглубокой вырезкой. Ноги слабые; цевка тонкая, короткая, покрыта спереди несколькими поперечными щитками; пальцы тонкие с небольшими когтями. Оперение мягкое, густое; его окраска варьирует от серовато-бурой сверху и пятнистой снизу до яркой, контрастной, включающей блестящий синий, зеленовато-голубой, чёрный, белый, рыжий, оранжевый и жёлтый цвета, нередко яркие пятна-маркеры расположены на голове, горле, груди, крыльях и хвосте. Половой диморфизм выражен только у ярко окрашенных видов; гнездовый наряд пятнистый.

2 подсемейства: типичные М. (*Muscicapinae*, 15 родов, ок. 114 видов) и чекановые (*Saxicolinae*, ок. 33 родов и 160 видов), которых ранее относили к сем. дроздовых. Типичные М. широко распространены в Старом Свете; населяют ландшафты с древесной и кустарниковой растительностью, предпочитая лесные опушки и редколесья, в горах (Гималаи) до выс. 3900 м. Наибольшего видового разнообразия достигают в Юж. Азии; в Тропич. Африке и Азии ведут оседлый образ жизни; птицы Сев. Евразии перелётные, зимуют преим. в тропиках. В России гнездятся 4 вида настоящих мухоловок (род *Muscicapa*), 7 видов пёстрых мухоловок (*Ficedula*) и синяя мухоловка (*Cyanoptila cyanomelana*), в Приморье залетает сероголовая канареечная мухоловка (*Culicicapa seylonensis*). Питаются гл. обр. насекомыми, которых ловят в

воздухе и на земле в коротком броске с присады (отсюда назв.) или собирают в кронах; поедают также пауков, моллюсков, мокриц, иногда плоды. Моногамы (некоторым свойственна полигамия). Чашевидные гнёзда вьют в кронах, дуплах и нишах, охотно занимают искусств. гнездовья. В кладке от 2–4 (тропич. виды) до 5–11 яиц; насиживают (11–15 дней) самка или оба члена пары; выводок кормят оба родителя. Молодые особи покидают гнездо через 10–18 дней после вылупления, самостоятельными становятся в возрасте ок. 1 мес. В сезон обычно одна кладка. В Красную книгу МСОП внесены 29 видов типичных М., 1 из них находится в критич. состоянии, 4 – под угрозой исчезновения, 11 уязвимы; численность 13 видов близка к угрожаемой.

В Сев. и Юж. Америке экологич. нишу типичных М. занимают представители сем. тиранновых (Tyrannidae, 98 родов, ок. 400 видов) подотряда кричащих воробьиных, которых также называют тиранновыми мухоловками или мухоловковыми Нового Света.