

# НАНДУ

Авторы: В. М. Лоскот



Обыкновенный нанду.

НАНДУ (Rheidae), семейство птиц отр. страусообразных; иногда их выделяли в ранге отряда или подотряда. Ископаемые остатки Н. известны из палеоцена Юж. Америки. 2 рода, в каждом по одному виду: обыкновенный Н. (*Rhea americana*) и малый, или дарвинов, Н. (*Pterocnemia pennata*). Нелетающие птицы. Клюв уплощённый; шея длинная, тонкая; ноги сильные с 3 направленными вперёд пальцами; копчиковая железа, пигостиль и хвост отсутствуют. В отличие от [страусовых](#) голова, шея и голени полностью оперены. В нижней гортани имеются

трахеобронхиальные мышцы. Тело равномерно покрыто мягкими рассученными перьями, не имеющими добавочных стержней; крылья несут 28 небольших маховых перьев, прикрытых длинными кроющими; на первом пальце коготок. Обыкновенный нанду – наиболее крупная птица Нового Света: выс. до 140 см, масса ок. 23 (до 40) кг; самцы несколько крупнее самок. Оперение серовато-бурое сверху, беловатое снизу, у самца темя и основание шеи черноватые. Населяет гл. обр. пампасы и саванны в вост. части Юж. Америки (между 10 и 40° ю. ш.), предпочитает участки с высокими кустарниками или редколесьем вблизи водоёмов. Бегаёт очень быстро (до 60 км/ч) и манёвренно, используя крылья при резких поворотах; охотно купается, может плавать. Питается преим. сочными листьями, корешками, плодами и семенами, а также насекомыми (особенно прямокрылыми) и мелкими позвоночными животными. Для самцов характерна полигамия, для самок – полиандрия. Самец токует на охраняемом от соперников участке, издавая громкие звуки (отсюда

звукоподражательное назв. «нанду»). Его брачное поведение привлекает самок (обычно 3–8), которые откладывают в подготовленную самцом гнездовую ямку 13–30 жёлтых яиц (массой ок. 600 г). Насиживает (35–40 дней) и заботится о выводке самец; молодые особи достигают размера взрослых птиц в возрасте 5–6 мес, половозрелыми становятся на 2–3-м году жизни. Вне сезона размножения стаи Н. (до 100 птиц) кочуют в поисках пищи. Малый нанду отличается меньшими размерами (выс. до 1 м, масса до 29 кг) и пятнистым рисунком верха, образованным светлыми вершинами перьев, и зеленоватым цветом скорлупы яиц. Обитает от Юж. Перу до Юж. Аргентины, в поясе сухих степей (пуны) на внутр. плоскогорьях и плато в Центр. Андах (до выс. 4500 м) и в полупустынях Патагонии. Н. легко приручаются и размножаются в неволе. Численность диких птиц сокращается и близка к угрожаемой. Оба вида внесены в Красную книгу МСОП.