



# НАСЕКОМОЯДНЫЕ

Авторы: Н. А. Щипанов

---

НАСЕКОМОЯДНЫЕ (Eulipotyphla), отряд плацентарных млекопитающих. Таксономия отряда в последнее время подверглась значит. изменениям и пока не устоялась. Из существовавшего ранее отряда Н. (Insectivora) на основе молекулярных исследований были исключены тупаи и слоновые землеройки, которые рассматриваются теперь как самостоят. отряды, а златокроты и тенреки выделены в отряд афросорициды (Afrosoricidae). Семейства ежевые (Erinaceidae), землеройковые (Soricidae), кротовые (Talpidae), щелезубовые (Solenodontidae) и вымершее в историч. время сем. Nesophontidae объединяются в общий отряд (Eulipotyphla), который рассматривают как монофилетичный таксон. Иногда быв. отряд Insectivora делят на два отряда – ежеобразные (Erinaceomorpha) и землеройкообразные (Soricomorpha).

Отряд Eulipotyphla включает мелких животных с длиной тела от 3,5 см (землеройки) до 44 см (крысиные ежи). Волосной покров короткий и мягкий (землеройковые, кроты), иглистый или колючий (ежевые). Ряд признаков позволяет считать Н. таксоном, близким к примитивным плацентарным млекопитающим: слабо дифференцированные зубы, недоразвитые слуховые барабаны, стопоходящие конечности, слабая дифференциация головного мозга и др. Наибольшее число примитивных (плезиоморфных) признаков сохраняют ежевые. Распространены в Евразии, Сев. и Центр. Америке, на островах Карибского м., в Африке, где населяют разнообразные ландшафты от тундр до пустынь. Ежи интродуцированы в Новую Зеландию. Н. ведут подземный, наземный или полуводный образ жизни. Питаются разл.

беспозвоночными, некоторые виды хищничают. Беременность 11–40 дней. Половой зрелости достигают в возрасте 2 мес или на второй год жизни. Употребляя в пищу большое количество беспозвоночных, в т. ч. вредителей лесных и с.-х. культур, приносят пользу. Их роль как регуляторов численности насекомых в природных экосистемах также велика. Известно более 450 совр. видов, некоторые из них имеют

тенденцию к снижению численности, а ряд узкоареальных видов находится под угрозой исчезновения и требует спец. мер по охране.

## **Литература**

Лит.: Гуреев А. А. Насекомоядные (Mammalia, Insectivora): Ежи, кроты и землеройки (Erinaceidae, Talpidae, Soricidae). Л., 1979.