



ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ ТАХИКАРДІ́Я

Авторы: В. С. Никифоров

ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ ТАХИКАРДІ́Я, нарушение сердечного ритма, характеризующееся внезапным приступом (*пароксизмом*) частых регулярных сердечных сокращений (св. 120 в минуту). Различают наджелудочковую и желудочковую формы П. т. Приступ может длиться от нескольких минут до нескольких суток; сопровождается слабостью, головокружением, шумом в голове, чувством сжимания сердца. Возможные осложнения: падение артериального давления, обморок, развитие острой сердечной недостаточности, инфаркт миокарда и др. Желудочковая форма П. т. более неблагоприятна в связи с возможностью развития фибрилляции желудочков. Диагноз ставится на основании данных ЭКГ в момент приступа или с помощью длительного мониторирования (при редких приступах) и электрофизиологич. исследования. Лечение П. т. зависит от её формы, этиологии, частоты и длительности приступов, наличия осложнений. Для восстановления синусового ритма используют спец. механич. приёмы раздражения блуждающего нерва (напр., давление на глазные яблоки), *антиаритмические средства*, электроимпульсную терапию, а также хирургич. методы (имплантация кардиовертера-дефибриллятора и др.).

Литература

Лит.: Бокерия Л. А. Тахиаритмии: диагностика и хирургическое лечение. Л., 1989; Кушаковский М. С. Аритмии сердца: Расстройства сердечного ритма и нарушения проводимости. 3-е изд. СПб., 2004; Мазур Н. А. Пароксизмальные тахикардии. М., 2005.