


ПАРУСНИКОВЫЕ

Авторы: А. Н. Котляр



Парусниковые: 1 – индо-тихоокеанский парусник; 2 – полосатый копьеносец.

Рис. Е. Н. Федорченко

ПАРУСНИКОВЫЕ, копьерылые, марлиновые (Istiophoridae), семейство морских рыб отр. окунеобразных. Тело торпедовидное, покрыто мелкой чешуёй. Длина обычно 2–3 м; у чёрного марлина (*Makaira indica*) – до 4,4 м при массе до 708 кг. Голова коническая; верхняя челюсть вытянута в копьевидный отросток, округлый в сечении. На боках хвостового стебля по два кожистых выступа. Спина фиолетово-синяя, брюхо белое, имеются тёмные поперечные полосы. Первый из двух спинных плавников очень длинный; у рыб из рода парусники

(*Istiophorus*) этот плавник больше высоты тела и имеет вид паруса (отсюда назв.). Два анальных плавника. Хвостовой плавник серповидный. Грудные плавники длинные, расположены на боку над брюшными. Брюшные плавники также длинные, с 1–3 лучами. 3 рода: парусники (2 вида), *марлины* (3 вида) и копьеносцы (*Tetrapturus*, 6 видов). Распространены в тропич. и субтропич. водах Мирового ок.; в воды России в район юж. части Курильских о-вов и Юж. Приморья эпизодически проникают индо-тихоокеанский парусник (*I. platypterus*), чёрный марлин, индо-тихоокеанский марлин (*M. mazara*) и полосатый копьеносец (*T. audax*). Питаются стайными рыбами, кальмарами, крупными ракообразными. Могут развивать скорость до 100–130 км/ч. Высокая плодовитость; напр., у чёрного марлина – до 40 млн. икринок. Объект промысла и спортивного рыболовства.

Литература

Лит.: Nakamura I. Billfishes of the world. [Cat.]. Rome, 1985; Промысловые рыбы России. М., 2006. Т. 1–2.