



ВРАНОВЫЕ

Авторы: В. В. Иваницкий

ВРАНОВЫЕ, вороновые (*Corvidae*), семейство птиц отр. воробьинообразных.

Телосложение плотное, голова большая, крылья широкие, клюв прямой, крепкий.

Длина 30–65 см, масса до 1,5 кг. В окраске оперения у многих В. преобладает чёрный цвет, некоторые тропические представители семейства имеют многоцветную и яркую окраску. Половой диморфизм не выражен. 24 рода, 117 видов. Распространены всесветно, кроме Антарктиды, Новой Зеландии и некоторых океанич. островов. В России 15 видов: ворон, серая и чёрная вороны, сорока, сойка, кукушка, кедровка, галка, грач и др. Обитают в ландшафтах всех типов. Некоторые виды многочисленны в населённых пунктах (вороны, грачи, галки). Благодаря высокоорганизованной психике способны к сложным формам поведения и легко приспосабливаются к жизни рядом с человеком. Всеядны; некоторые (сойки, кедровки) запасают пищу впрок. Большинство В. ведут оседлый образ жизни. Моногамы; образуют постоянные пары. Гнёзда из веток устраивают на деревьях и кустах, иногда в закрытых убежищах (дуплах, расщелинах скал и др.). Обычно гнездятся отдельными парами, некоторые виды образуют колонии (грачи, галки). Кладку из 2–8 яиц у большинства В. насиживает самка в течение 16–22 сут. Птенцы остаются в гнезде 20–45 сут. У ряда представителей семейства молодые птицы подолгу (иногда неск. лет) живут на территории родителей и помогают им кормить птенцов последующих выводков. Вороны и сороки могут приносить значит. вред, разоряя птичьи гнёзда. Грачи местами вредят всходам с.-х. культур. Массовая концентрация ворон, галок и грачей вблизи аэродромов может угрожать безопасности полётов. Более 20 представителей В. внесены в Красную книгу МСОП.