

# ГАТТЕРИЯ

Авторы: Н. Б. Ананьева



Гаттерия.

ГАТТЕРИЯ, туатара (*Sphenodon punctatus*), единственный сохранившийся до наших дней представитель подкласса чешуйчатых отр. клювоголовых пресмыкающихся, известных с триасового периода. Внешне Г. напоминает крупную ящерицу (длина тела до 75 см). Туловище массивное, голова большая, конечности пятипалые. От затылка вдоль спины и хвоста тянется невысокий гребень из плоских треугольных чешуй. Окраска тела тусклая,

оливково-зелёная. До прихода европейцев Г. населяла Северный и Южный о-ва Новой Зеландии, к кон. 19 в. вымерла. Сохранилась только на мелких прибрежных островах; часть Г. реинтродуцирована на о. Северный. Живёт в норах глубиной до 1 м, в которых часто гнездятся также мелкие буревестники. Активна в сумерках и ночью. Питается насекомыми и др. беспозвоночными, изредка поедает яйца и птенцов. Спаривание в январе. В октябре – декабре самки откладывают в норах 8–15 яиц в твёрдой скорлупе. Инкубац. период 12–15 мес. Растёт Г. очень медленно; половой зрелости достигает к 20 годам. Доживает до 120 лет. Внесена в Красную книгу МСОП. Осуществляются междунар. программы по изучению и разведению гаттерии.