



# ГЕМИПЛЕГІЯ

---

ГЕМИПЛЕГІЯ (от греч. ἡμι— полу- и πλῆγῆ — удар, поражение), паралич мышц одной половины (стороны) тела. Развивается при органич. поражении головного и спинного мозга, нарушении мозгового кровообращения (кровоизлияния, тромбоз, эмболия, спазм сосудов головного мозга), инфекциях (очаговый энцефалит, менингит, абсцесс мозга), родовых травмах, опухолях, наследств. и др. заболеваниях головного и спинного мозга. Г. при этих патологич. состояниях называют органической, т. к. при этом повреждается *пирамидная система*, ответственная за двигательные акты, в отличие от т. н. функциональной Г., которая возникает при *истерии*. Для органич. Г. характерны паралич руки и ноги, повышение в них мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, появление патологич. рефлексов и др. В зависимости от локализации поражения выделяют неск. форм Г. (корковая, пирамидно-экстрапирамидная, пирамидно-церебеллярная, пирамидно-таламическая и др.), имеющих свои особенности клинич. картины и течения. В зависимости от характера и степени поражения пирамидной системы нормальные движения могут восстанавливаться полностью или могут сохраняться остаточные явления (парезы, нарушения чувствительности и др.). Функциональная Г. исчезает обычно бесследно. Паралич одной конечности называют моноплегией, всех четырёх конечностей — тетраплегией; неполный паралич (парез) одной конечности — монопарезом, мышц одной стороны тела — гемипарезом, всех четырёх конечностей — тетрапарезом. Лечение зависит от причины и характера поражения при Г. Для восстановления нарушенных функций в схему лечения обязательно включают физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, массаж.

## Литература

Лит. см. при ст. Паралич.