



ГИМЕНОЛЕПИДО́З

Авторы: В. И. Лучшев

ГИМЕНОЛЕПИДО́З, гельминтоз из группы *цестодозов*, вызываемый ленточным глистом – карликовым цепнем (см. *Цепни*). Распространён повсеместно, чаще встречается в странах с жарким и сухим климатом. Взрослые гельминты паразитируют в тонком кишечнике человека, с экскрементами во внеш. среду попадают яйца гельминта. Заражение человека происходит вследствие фекального загрязнения предметов домашнего обихода, продуктов, рук. Патогенез Г. связан с механич. повреждением паразитами слизистой оболочки кишечника, сенсibilизацией продуктами жизнедеятельности личинок гельминта и присоединением вторичной микробной флоры. Больных беспокоят головная боль, слабость, недомогание, раздражительность, головокружение, снижение аппетита, слюнотечение, тошнота, полиморфная сыпь, боли в суставах, в животе, жидкий стул. В кале обнаруживают яйца гельминтов. Необходимо обследовать детей 3–12 лет, персонал дошкольных и школьных учреждений, интернатов, предприятий обществ. питания и торговли. Лечение: празиквантель (билтрицид), фенасал. Профилактика: тщательное соблюдение правил личной гигиены.

Литература

Лит.: Гельминтозы человека / Под ред. В. И. Лучшева, В. В. Лебедева. Краснодар, 2004.