

ГЛУПЫШ

Авторы: В. М. Лоскот



Фото Aurelien Andevard
Глупыш обыкновенный.

ГЛУПЫШ обыкновенный (*Fulmarus glacialis*), океанич. птица сем. буревестниковых. Длина 45–50 см; масса до 1 кг, размах крыльев 102–112 см. Самцы и самки окрашены одинаково; существуют цветовые морфы. У светлой морфы голова, шея и низ тела белые, остальное оперение светло-серое; у промежуточной и тёмной морф белый цвет заменён серым разл. интенсивности, остальное оперение тёмно- или буровато-серое.

Населяет скалистые острова и материковые побережья в арктич. и бореальной зонах Атлантического и Тихого океанов. В период гнездования в местах кормления образует тысячные скопления. Вне гнездового периода Г. часто держится одиночно, парами или небольшими стаями. Превосходно летает даже в шторм, используя динамич. парение. Хорошо плавает, ныряет на глубину до 4 м. Питается преим. ракообразными, головоногими моллюсками, рыбой, отходами мор. промыслов и падалью. Размножаться начинает в возрасте 6–12 лет. Моногам. Гнездовая ямка обычно без выстилки; в кладке 1 яйцо. Насиживают (49–53 сут) и кормят птенца оба родителя. В антарктич. зоне обитает др. представитель рода – антарктический Г. (*F. glacialisoides*).