

ГОЛОВАЧ

Авторы: Л. В. Гарибова



Головач пузыревидный.

ГОЛОВАЧ (*Handkea*, или *Calvatia*), род грибов из группы гастеромицеты порядка дождевиковых. Грибы шаровидной, овальной или чаще обратногрушевидной формы. Оболочка сначала белая, затем серо-коричневая. Незрелая мякоть почти белая, зрелая – распыляющаяся, охряная, лиловая, коричневая, пурпурная или оливковая. Зрелый гриб после разрушения верхней половины оболочки имеет вид кубка или чаши, наполненной массой спор. Ок. 35 видов, в России ок. 10. Распространены в сев. части умеренной зоны в лесах, степях, на лугах. Г. продолговатый

(*H. excipuliformis*) с высокой ножкой заходит в субтропич. и тропич. зоны. Молодые Г. пузыревидный (*H. utriformis*), Г. лиловый (*H. lilacina*) и близкий к ним представитель др. рода – лангерманния гигантская (*Langermannia gigantea*), известная под назв. «Г. гигантский» (плодовые тела массой 4–20 кг), съедобны. Их белая мякоть используется в нар. медицине как кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство. В них обнаружен антибиотик кальвацин. Г. гигантский и Г. пузыревидный обладают анестезирующим действием.