

ГОРИЛЛЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Горилла.

ГОРИЛЛЫ (*Gorilla*), род млекопитающих отр. приматов с единственным одноим. видом *G. gorilla*; наиболее крупный представитель человекообразных обезьян. Длина тела до 180 см, масса до 280 кг; самцы намного крупнее самок. Туловище бочкообразное: грудная клетка мощная (охват груди у самцов до 175 см), живот толстый, шея короткая. Конечности сильные, задние – укороченные. Пальцы короткие, с уплощёнными ногтями; на задних конечностях соединены перепонками. Голова округлая, со слабо выступающим лицевым отделом. Уши

маленькие, прижаты к голове; сильно развитые надбровные дуги нависают над глазами. В верхней части головы имеется «подушка», образованная утолщением кожи. Ноздри крупные. Объём головного мозга 400–600 см³. Тело покрыто грубой и редкой шерстью чёрного цвета (у старых самцов она становится серебристо-серой); лицо, уши, кисти и стопы голые.

Г. распространены в равнинных и горных (до выс. 3500 м) тропич. лесах Центр. Африки. По местам обитания иногда выделяют 2 вида: западную гориллу (*G. gorilla*) и восточную гориллу (*G. beringei*); по др. системе различают западную береговую, восточную горную и восточную равнинную Г., рассматривая их как подвиды. Г. ведут наземный образ жизни. При ходьбе животное наступает на полную ступню и опирается на тыльную поверхность пальцев и кистей рук. Активны днём. Питаются исключительно растит. кормами (в рацион входит не менее 29 видов

растений). Держатся группами по 5–15 особей, иногда объединяются в стада до 40 особей. Группу составляют самки с детёнышами и молодые самцы; предводительствует крупный самец, который, однако, не является хозяином гарема (самки сами выбирают партнёра). Г. весьма миролюбивы и терпимы друг к другу. Для коммуникации они широко используют мимику, жесты и разнообразные звуки.

Перемещаются по большой территории (до 18 км²), устраивая ночлег там, где их застигнут сумерки; при этом на деревьях или на земле они строят гнёзда, которые повторно не используются. Беременность ок. 9 мес, самка рождает 1 детёныша.

Причинами снижения численности Г. являются катастрофич. сокращение местообитаний в результате уничтожения лесов, а также браконьерство. Внесены в Красную книгу МСОП.

Литература

Лит.: Napier J. R., Napier P. H. A handbook of living primates. L.; N. Y., 1967; idem. The natural history of the primates. L., 1985; Шаллер Д. Б. Год под знаком гориллы. 2-е изд. М., 1971; Tylinek E., Berger G. Das große Affenbuch. Lpz., 1983.