



# КОЛХИДСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

КОЛХИДСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ (Рионская низменность), в Грузии, в нижнем течении рек Риони и Ингури и на побережье Чёрного м. (между городами Сухуми и Кобулети). Протяжённость с запада на восток ок. 100 км. На западе едва возвышается над уровнем моря, на востоке у подножий гор окаймлена расчленёнными террасами выс. до 150 м. К. н. – аллювиальная равнина, осложнённая староречьями, прирусловыми валами и небольшими песчаными массивами. Выходы минер. источников (г. Цхалтубо). Климат субтропич. влажный, с мягкой зимой и жарким летом, с небольшими амплитудами годовых и суточных температур. Ср. темп-ры января от 4,5 до 6 °С, августа 23–24 °С. Осадки (1400–1900 мм) выпадают довольно равномерно в течение года. На западе преобладают болотные ландшафты с осоково-ситниковой и осоково-разнотравной растительностью, сфагновым покровом и тростниковыми зарослями; значит. площадь занимают ольховые леса. Проведены большие работы по осушению болот (ок. 40% земель). На приподнятых окраинах распространены субтропич. влажные полидоминантные (дуб, бук, каштан, тис, ясень, граб и др.) леса с вечнозелёным подлеском (падуб, рододендрон, лавровишня, самшит) и лианами (т. н. леса колхидского типа) на элювиально-глеевых почвах, краснозёмах и желтозёмах. Близ г. Поти – реликтовое остаточное-лагунное оз. Палеостоми. В пределах К. н. – Колхидский заповедник. К. н. – важнейший район по возделыванию субтропич. культур (цитрусовые, чай, тунг). В 1987 на её территории произошло катастрофич. наводнение.

## Литература

Лит.: Колхидская низменность: природные условия и социально-экономические аспекты / Под ред. Г. Г. Сванидзе. Л., 1989.